

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,  
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Supplément n° 2 au bulletin n° 54

1965 - 6

## - INFORMATIONS -

### GRANDES CULTURES

#### CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA :

Dans notre dernière note nous incitions les producteurs de colza à être vigilants et à se préparer à traiter. En effet les premières élévations de température vont favoriser la ponte des femelles du charançon. Rappelons que cette ponte, effectuée au sommet des jeunes tiges, dans la zone d'élongation, est surtout abondante en début de montaison. Elle est à l'origine des dégâts constatés par la suite. Il est donc recommandé de traiter sans plus attendre dans les zones où des attaques ont déjà été notées les années précédentes. Cette recommandation intéresse tout spécialement la région du Lauragais.

Dans les régions où la végétation du colza a pu être retardée par le froid, il conviendra, si l'on craint les dégâts de l'inscote de surveiller attentivement les cultures et d'assurer la protection des colzas en début de montaison.

On se reportera, pour le choix des produits et des doses à utiliser, aux indications de la note spéciale.

### ARBRES FRUITIERS

#### ANTHONOME DU POMMIER :

Dans les vergers où des dégâts ont été observés en 1964, appliquer, sur toutes variétés parvenues au stade B un produit à base soit de H.C.H. (100 grs MA/HL) soit de Lindane (12 grs MA/HL) soit de D.D.T. (100 grs MA/HL).

#### XYLEBORE DISPARATE :

Dans les plantations où cet insecte cause habituellement des dégâts il y aurait lieu d'intervenir dans les prochains jours avec un insecticide persistant à forte dose. Employer par exemple du D.D.T. ou de l'H.C.H. à raison de 300 grammes de matière active à l'hectolitre d'eau et ajouter un litre d'huile blanche d'été qui augmentera l'efficacité du traitement.

#### MONILIA DE L'ABRICOTIER :

Un nouveau traitement, avec un produit fongicide de synthèse (Captane, Dichlone, Thirame) devrait être mis en place vers la fin de la floraison, notamment si le temps se révèle alors humide.

### CULTURES LEGUMIERES :

#### - Maladies du feuillage du fraisier :

Dans les situations bien exposées les fraisiers viennent d'entrer en végétation active. En conséquence il y aurait lieu d'appliquer, uniquement sur les variétés très sensibles aux attaques de la maladie des taches rouges en particulier, un premier traitement dès avant la première pluie à venir (voir le Bulletin n°54 de mars 1965).

TOULOUSE, le 15 MARS 1965

Les Contrôleurs chargés des

Avertissements Agricoles : J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur

de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements de TOULOUSE. Le Directeur Gérant : L. BOUYX

753